

## 2.消化器系

### 2-1食道癌

#### 2-1-1 化学放射線療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CDDP+5FU放射線併用	シスプラチン フルオロウラシル	CDDP: 70mg/m <sup>2</sup> 5-FU: 750mg/m <sup>2</sup>	d1 d1-4	28日間	高度	

#### 2-1-2 化学療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CDDP+5FU	シスプラチン フルオロウラシル	CDDP: 70mg/m <sup>2</sup> 5-FU: 750mg/m <sup>2</sup>	d1 d1-5	28日間	高度	
DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	DTX: 60mg/m <sup>2</sup> CDDP: 60mg/m <sup>2</sup> 5-FU: 800mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1-5	28日間	高度	
DTX	ドセタキセル	DTX: 70mg/m <sup>2</sup>	d1	21日間	軽度	
PTX	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15.22.29.36	56日間	軽度	6投2休
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg	d1	14日間	-	
ニボルマブ 4週ごと	ニボルマブ	480mg	d1	28日間	-	
ネダプラチン+5FU	ネダプラチン フルオロウラシル	NED: 90mg/m <sup>2</sup> 5-FU: 800mg/m <sup>2</sup>	d1 d1-5	28日間	中等度	
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg	d1	21日間	-	
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg	d1	42日間	-	
ペムブロリズマブ+5FU	ペムブロリズマブ フルオロウラシル	キイトルダ: 200mg 5-FU: 800mg/m <sup>2</sup>	d1 d1-5	21日間	軽度	
ペムブロリズマブ+CDDP+5-FU	ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル	キイトルダ: 200mg CDDP: 80mg/m <sup>2</sup> 5-FU: 800mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1-5	21日間	高度	