

2. 消化器系

2-1 食道癌

2-1-1 化学放射線療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CDDP+5FU放射線併用	シスプラチン フルオロウラシル	CDDP: 70mg/m ² 5-FU: 750mg/m ²	d1 d1-4	28日間	高度	
CDDP+5FU放射線(50.4Gy)併用	シスプラチン フルオロウラシル	CDDP: 75mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ²	d1 d1-4	28日間	高度	2コース
ネダプラチン+5FU放射線併用	ネダプラチン フルオロウラシル	NED: 90mg/m ² 5-FU: 800mg/m ²	d1 d1-5	35日間	高度	

2-1-2 化学療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CDDP+5FU	シスプラチン フルオロウラシル	CDDP: 70mg/m ² 5-FU: 750mg/m ²	d1 d1-5	28日間	高度	
DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	DTX: 60mg/m ² CDDP: 60mg/m ² 5-FU: 800mg/m ²	d1 d1 d1-5	28日間	高度	
DTX	ドセタキセル	DTX: 70mg/m ²	d1	21日間	軽度	
NEO DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	DTX: 70mg/m ² CDDP: 70mg/m ² 5-FU: 750mg/m ²	d1 d1 d1-5	21日間	高度	
PTX	パクリタキセル	100mg/m ²	d1.8.15.22.29.36	56日間	軽度	6投2休
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg	d1	14日間	-	
ニボルマブ 4週ごと	ニボルマブ	480mg	d1	28日間	-	
ニボルマブ(2週間隔)+CDDP+5FU	ニボルマブ シスプラチン フルオロウラシル	Nivo: 240mg CDDP: 80mg/m ² 5-FU: 800mg/m ²	d1.15 d1 d1	28日間	d1: 高度 d15: -	
ニボルマブ(4週間隔)+CDDP+5FU	ニボルマブ シスプラチン フルオロウラシル	Nivo: 480mg CDDP: 80mg/m ² 5-FU: 800mg/m ²	d1 d1 d1	28日間	高度	
ニボルマブ(2週間隔)+イビリムマブ	ニボルマブ イビリムマブ	Nivo: 240mg Ipilimumab: 1mg/kg	d1.15.29 d1	42日間	最小度	
ニボルマブ(3週間隔)+イビリムマブ	ニボルマブ イビリムマブ	Nivo: 360mg Ipilimumab: 1mg/kg	d1.22 d1	42日間	最小度	
ネダプラチン+5FU	ネダプラチン フルオロウラシル	NED: 90mg/m ² 5-FU: 800mg/m ²	d1 d1-5	28日間	中等度	
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg	d1	21日間	-	
ペムブロリズマブ(6週ごと)	ペムブロリズマブ	400mg	d1	42日間	-	
ペムブロリズマブ+5FU	ペムブロリズマブ フルオロウラシル	キイトルダ: 200mg 5-FU: 800mg/m ²	d1 d1-5	21日間	軽度	
ペムブロリズマブ+CDDP+5-FU	ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル	キイトルダ: 200mg CDDP: 80mg/m ² 5-FU: 800mg/m ²	d1 d1 d1-5	21日間	高度	