

5.婦人科系

5-1 子宮頸癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
BEV	ベパシマブ	15mg/kg	d1	21日間	最小度	
CPT11	イリリテカン	100mg/m ²	d1,8,15	28日間	中等度	
DC	ドセタキセル カルボプラチン	DTX: 70mg/m ² CBDCA: AUC5	d1 d1	21日間	中等度	
NDP	ネダプラチン	100mg/m ²	d1	28日間	中等度	
TC	パクリタキセル カルボプラチン	PTX: 175mg/m ² CBDCA: AUC5	d1 d1	21日間	中等度	
TC+BEV	パクリタキセル カルボプラチン ベパシマブ	PTX: 175mg/m ² CBDCA: AUC5 BEV: 15mg/kg	d1 d1 d1	21日間	中等度	
TP	パクリタキセル シスプラチン	PTX: 175mg/m ² CDDP: 50mg/m ²	d1 d1	21日間	高度	
TP+BEV	パクリタキセル シスプラチン ベパシマブ	PTX: 175mg/m ² CDDP: 50mg/m ² BEV: 15mg/kg	d1 d1 d1	21日間	高度	
ベムプロリズマブ+TC ベムプロリズマブ+TC+BEV ベムプロリズマブ ベムプロリズマブ+BEV	パクリタキセル カルボプラチン ベパシマブ ベムプロリズマブ	PTX: 175mg/m ² CBDCA: AUC5 BEV: 15mg/kg ベムプロリズマブ: 200mg	d1 d1 d1 d1	21日間	中等度	6コース終了後 ベムプロリズマブ±BEV維持療法 ベムプロリズマブ:最大35コース
(CCRT)CBDCA	カルボプラチン	AUC2	d1	7日間	中等度	
(CCRT)CDDP	シスプラチン	40mg/m ²	d1	7日間	高度	
(CCRT)NDP	ネダプラチン	30mg/m ²	d1	7日間	中等度	

5-2 子宮体癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
AP	トキソリビシン シスプラチン	DXR: 60mg/m ² CDDP: 50mg/m ²	d1 d1	21日間	高度	
DC	ドセタキセル カルボプラチン	DTX: 70mg/m ² CBDCA: AUC5	d1 d1	21日間	中等度	
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	d1	21日間	軽度	
PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	d1	21日間	軽度	
TC	パクリタキセル カルボプラチン	PTX: 175mg/m ² CBDCA: AUC5	d1 d1	21日間	中等度	
ベムプロリズマブ(3週間隔)+レンパチニブ	ベムプロリズマブ レンパチニブ	ベムプロリズマブ: 200mg レンパチニブ: 20mg po	d1 d1-21	21日間	-	
ベムプロリズマブ(6週間隔)+レンパチニブ	ベムプロリズマブ レンパチニブ	ベムプロリズマブ: 400mg レンパチニブ: 20mg po	d1 d1-42	42日間	-	

5-3 卵巣癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
BEV	ベパシマブ	15mg/kg	d1	21日間	最小度	
CPT11	イリリテカン	100mg/m ²	d1,8,15	28日間	中等度	
DC	ドセタキセル カルボプラチン	DTX: 70mg/m ² CBDCA: AUC5	d1 d1	21日間	中等度	
DC+BEV	ドセタキセル カルボプラチン ベパシマブ	DTX: 70mg/m ² CBDCA: AUC5 BEV: 15mg/kg	d1 d1 d1	21日間	中等度	
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	d1	21日間	軽度	
GC	ゲムシタビン カルボプラチン	GEM: 1000mg/m ² CBDCA: AUC4	d1,8 d1	21日間	中等度	
GC+BEV	ゲムシタビン カルボプラチン ベパシマブ	GEM: 1000mg/m ² CBDCA: AUC4 BEV: 15mg/kg	d1,8 d1 d1	21日間	d1: 中等度 d8: 軽度	
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	d1,8,15	28日間	軽度	
GEM+BEV	ゲムシタビン ベパシマブ	GEM: 1000mg/m ² BEV: 15mg/kg	d1,8 d1	21日間	軽度	
NDP	ネダプラチン	100mg/m ²	d1	28日間	中等度	
PLD	ペグ化リホソームドキシルビシン	40mg/m ²	d1	28日間	軽度	
PLD+BEV	ペグ化リホソームドキシルビシン ベパシマブ	PLD: 40mg/m ² BEV: 10mg/kg	d1 d1,15	28日間	軽度	
PLDC	ペグ化リホソームドキシルビシン カルボプラチン	PLD: 30mg/m ² CBDCA: AUC:5	d1 d1	28日間	中等度	
PLDC+BEV	ペグ化リホソームドキシルビシン カルボプラチン ベパシマブ	PLD: 30mg/m ² CBDCA: AUC:5 BEV: 10mg/kg	d1 d1 d1,15	28日間	中等度	
PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	d1	21日間	軽度	
TC	パクリタキセル カルボプラチン	PTX: 175mg/m ² CBDCA: AUC5	d1 d1	21日間	中等度	

5-3 卵巣癌のつづき

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
TC+BEV	パクリタキセル カルボプラチン ベハシスマブ	PTX: 175mg/m ² CBDCA: AUC5 BEV: 15mg/kg	d1 d1 d1	21日間	中等度	
TOP	ノキテカン	1.25mg/m ²	d1-5	21日間	軽度	
TOP+BEV	ノキテカン ベハシスマブ	TOP: 1.25mg/m ² BEV: 15mg/kg	d1-5 d1	21日間	軽度	
ddTC	パクリタキセル カルボプラチン	PTX: 80mg/m ² CBDCA: AUC6	d1.8.15 d1	21日間	中等度	
weeklyPTX	パクリタキセル	80mg/m ²	d1.8.15	21日間	軽度	
weeklyPTX+BEV	パクリタキセル ベハシスマブ	PTX: 80mg/m ² BEV: 10mg/kg	d1.8.15.22 d1.15	28日間	軽度	
オラパリブ+BEV	オラパリブ ベハシスマブ	オラパリブ: 1回300mg 1日2回 BEV: 15mg/kg	連日 d1	21日間	-	相同組み換え修復欠損を有する 卵巣がん

5-4 子宮肉腫

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
DTX+GEM	ドセタキセル ゲムシタビン	DTX: 70mg/m ² GEM: 900mg/m ²	d8 d1.8	21日間	軽度	
DXR	ドキソルビシン	75mg/m ²	d1	21日間	中等度	
IFM	イホスファミド	1200mg/m ²	d1-3	28日間	中等度	

5-5 卵巣胚細胞腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
BEP	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	BLM: 30mg VP-16: 100mg/m ² CDDP: 20mg/m ²	d1.8.15 d1-5 d1-5	21日間	高度	

5-6 絨毛性疾患

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
EMA/CO	メトトレキサート エトポシド アクチマイシンD シクロホスファミド ビンクリスチン ホリナートカルシウム	MTX: 300mg/m ² VP-16: 100mg/m ² ACT-D: 0.5mg CPA: 600mg/m ² VCR: 1mg/m ² LV: 15mg/回 q12 4回 p.o.	d1 d1.2 d1.2 d8 d8 d2-3	14日間	中等度	
ACT-D	アクチマイシンD	0.01mg/kg	d1-5	14日間	-	
MTX	メトトレキサート	0.4mg/kg	d1-5	14日間	最小度	

5-7 異所性妊娠

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
MTX	メトトレキサート	50mg/m ² (i.m)	d1	7日間	中等度	